**Autour de questions méthodologiques
soulevées par la construction, le traitement
et l'analyse des données utiles à la
recherche en sciences humaines et sociales.**

**Quelques apports de l'Analyse Statistique Implicative : de
l'exploratoire au confirmatoire**

Jean-Claude Régnier

UMR 5191 ICAR Université Lyon2

ASI - séminaire Martinique- Jean-Claude Régnier

24/06/2024

1

L'implication statistique (1)

*Un cadre théorique d'analyse
exploratoire des données fondée sur
l'analyse statistique implicative*

Jean-Claude Régnier

UMR 5191 ICAR Université Lyon2

Une question historique dans le développement de l'A.S.I. sur laquelle se sont basés les travaux de Régis Gras (1933-2022), fondateur du cadre théorique de l'A.S.I.

Dans quelle mesure la réussite à un problème de type A entraîne-t-elle la réussite à un problème de type B ?

sujets	A	B
S1	1	1
S2	0	0
S3	1	1
S4	1	1
S5	1	1
S6	0	1
S7	0	0
S8	0	1
S9	1	1
S10	1	1

	A	B		
A			1	0
B			0	
	1	6	0	6
	0	2	2	4
		8	2	10

[Réussite A] → [Réussite B]

sujets	A	B
S1	0	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	1	0
S5	0	0
S6	1	1
S7	1	1
S8	0	0
S9	0	1
S10	0	0

	A	B		
A			1	0
B			0	
	1	3	1	4
	0	2	4	6
		5	5	10

[Réussite A] ■ ? ► [Réussite B]

Enquête par Questionnaire

- Questionnaire et format des questions :
-

quest2008_2009.pdf
Adobe Acrobat Document
1 329 Ko

- Traitements initiaux : saisie dans un tableau de données

EnqueteSTAT2008_2009.xls
Feuille Microsoft Office Excel 9...
1 679 Ko

1 Vous et votre parcours antérieur de formation

[V1] Homme Femme
(entourez la réponse)

[V2] Date de naissance :

Codage pour anonymat :

[V3] Vous êtes-vous déjà trouvé(e) confronté(e) à des situations qui demandent des connaissances en statistique ? : (Entourez votre réponse)

1_Jamais 2_Rarement 3_Quelquefois 4_Souvent 5_Très souvent 6_Presque chaque jour

[V4] Quand des connaissances en statistique sont requises, cela vous pose-t-il des problèmes ? : (Entourez votre réponse)

1_Pas du tout 2_Rarement 3_Quelquefois 4_Souvent 5_Très souvent 6_Toujours

Variable binaire : 0 ; 1

Age à la date de l'enquête

Variable modale : 0 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1

Implication statistique

Implication statistique

http://www.numdam.org/article/RSA_2005__53_1_5_0.pdf

Variables de rang

Tableau de contingence

A \ B	B	B est réalisé 1	B n'est pas réalisé 0	effectifs
A est réalisé 1		$n_{(A \text{ et } B)}$	$n_{(A \text{ et non}B)}$	$n_{(A)}$
A n'est pas réalisé 0		$n_{(\text{non}A \text{ et } B)}$	$n_{(\text{non}A \text{ et non}B)}$	$n_{(\text{non}A)}$
effectifs		$n_{(B)}$	$n_{(\text{non}B)}$	n

Effectif attendu sous l'hypothèse d'indépendance :

$$\frac{n_{(A)} n_{(\text{non}B)}}{n}$$

Tableau de contingence

A \ B	B	B est réalisé 1	B n'est pas réalisé 0	effectifs
A est réalisé 1		$n_{(A \text{ et } B)}$	$n_{(A \text{ et non}B)}$	$n_{(A)}$
A n'est pas réalisé 0		$n_{(\text{non}A \text{ et } B)}$	$n_{(\text{non}A \text{ et non}B)}$	$n_{(\text{non}A)}$
effectifs		$n_{(B)}$	$n_{(\text{non}B)}$	n

Effectif observé : $n_{(A \text{ et non}B)} < \frac{n_{(A)} n_{(\text{non}B)}}{N}$

Répulsion de A et nonB

Attraction de A et B

Tableau de contingence

A \ B	B	B est réalisé 1	B n'est pas réalisé 0	effectifs
A est réalisé 1		$n_{(A \text{ et } B)}$	$n_{(A \text{ et non}B)}$	$n_{(A)}$
A n'est pas réalisé 0		$n_{(\text{non}A \text{ et } B)}$	$n_{(\text{non}A \text{ et non}B)}$	$n_{(\text{non}A)}$
effectifs		$n_{(B)}$	$n_{(\text{non}B)}$	n

Effectif observé : $n_{(A \text{ et non}B)} > \frac{n_{(A)} n_{(\text{non}B)}}{n}$

Répulsion de A et B

Attraction de A et nonB

sujets	A	B
S1	0	0
S2	0	1
S3	1	1
S4	1	0
S5	0	0
S6	1	1
S7	1	1
S8	0	0
S9	0	1
S10	0	0

	A	B		
A			1	0
B			0	1
	1	3	1	4
	0	2	4	6
		5	5	10

Étude des Similarités

Tableau de contingence

A \ B	B	B est réalisé 1	B n'est pas réalisé 0	effectifs
A est réalisé 1		$n_{(A \text{ et } B)}$ similarité A et B	$n_{(A \text{ et non } B)}$ implication A vers B	$n_{(A)}$
A n'est pas réalisé 0		$n_{(\text{non } A \text{ et } B)}$ implication nonB vers nonA	$n_{(\text{non } A \text{ et non } B)}$ similarité nonA et nonB	$n_{(\text{non } A)}$
effectifs		$n_{(B)}$	$n_{(\text{non } B)}$	n

$$0 \leq n_{(A \text{ et non } B)} \leq n_{(A)} \leq n_{(B)} \leq n$$

$$0 \leq n_{(\text{non } A \text{ et } B)} \leq n_{(\text{non } B)} \leq n_{(\text{non } A)} \leq n$$

Ressources...

Références bibliographiques sur l'Analyse Statistique Implicative

<https://sites.univ-lyon2.fr/asi/ref/refasi>

12 Colloques internationaux entre 2000 et 2023

<https://sites.univ-lyon2.fr/asi/12/>

Outils...

A propos de Chic

Version 7.0
Copyright © 2014

OK

Méthode d'analyse implicative des données de :

- Régis Gras : Ecole Polytechnique - Université de Nantes
email : regisgra@club-internet.fr

Assisté de :

- Saddo Ag Almouloud
- Marc Bailleul
- Antoine Bodin
- Annie Larher
- Harrisson Ratsimba-Rajohn
- Jean-Claude Régnier
- André Totohasina

Réalisation du logiciel sous Windows :

- Raphaël Couturier
email : raphael.couturier@iut-bm.univ-fcomte.fr

A partir d'une version sous dos élaborée par :

- Saddo Ag Almouloud

Outil logiciel

CHIC

Version 7.0

Classification Hiérarchique Implicative et Cohésitive

L'implication statistique (2)

*Quelques concepts fondateurs de
la méthode d'analyse statistique
implicative*

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche classique

Les parties grisées représentent les contre-exemples à l'implication $a \Rightarrow b$

Fig. 1- représentation par les diagrammes d'Euler

		Variable b		
		1	0	Total
Variable a	1	$n(a \wedge b)$	$n(a \wedge \bar{b})$	$n(a)$
	0	$n(\bar{a} \wedge b)$	$n(\bar{a} \wedge \bar{b})$	$n(\bar{a})$
Total		$n(b)$	$n(\bar{b})$	n

TAB 4 - Tableau de contingence avec les notations ASI

Définition 1: la quasi-règle $a \Rightarrow b$ est *admissible au niveau de confiance* $1 - \alpha$ si et seulement si $\Pr\left[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) \leq \text{card}(A \cap \bar{B})\right] \leq \alpha$

Intuitivement et qualitativement, ceci signifie que la quasi-implication $a \Rightarrow b$ sera admissible à l'issue d'une expérience si le nombre d'individus de E la contredisant est invraisemblablement petit par rapport au nombre d'individus attendu sous une hypothèse d'absence de lien.

Intensité d'implication

$$\varphi(a; b)$$

Définition 2: On appelle intensité d'implication de la quasi-règle $a \Rightarrow b$, le nombre $\varphi(a, b) = 1 - \Pr \left[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) \leq \text{Card}(A \cap \bar{B}) \right]$ si $n_b \neq n$ et $\varphi(a, b) = 0$ si $n_b = n$

Indice d'implication

Définition 3: On appelle **indice d'implication** de la quasi-règle $a \Rightarrow b$, la variable aléatoire, notée $Q(a, \bar{b})$, déduite de la variable aléatoire $Card(X \cap \bar{Y})$ par centrage réduction.

$$Q(a, \bar{b}) = \frac{Card(X \cap \bar{Y}) - E[Card(X \cap \bar{Y})]}{\sigma[Card(X \cap \bar{Y})]}$$

L'intensité d'implication est une **valeur probabiliste**, et non une fréquence, qui fonde la décision de retenir ou non une relation de quasi-implication entre les variables binaires a et b.

Cette modélisation de la quasi-implication est pertinente pour **mesurer l'étonnement face au constat de la petitesse du nombre des contre-exemples en regard du nombre surprenant des instances de l'implication**. Il s'agit d'une mesure de la qualité inductive et informative de l'implication. Par conséquent, si la règle est triviale, comme dans le cas où B est très grand ou coïncide avec E, cet étonnement devient petit. Nous démontrons (Gras R., 1996 c) d'ailleurs que cette trivialité se traduit par une intensité d'implication très faible, voire nulle : *Si, n_a étant fixé et A étant inclus dans B, n_b tend vers n (B "croît" vers E), alors $\varphi(a,b)$ tend vers 0.* C'est pourquoi nous définissons par « continuité »: $\varphi(a,b) = 0$ si $n_b = n$. De même, si $A \subset B$, $\varphi(a,b)$ peut être inférieure à 1 dans le cas où la confiance inductive, mesurée par l'étonnement statistique, est insuffisante.

Différents modèles pour évaluer l'intensité d'implication.

La détermination de **l'intensité d'implication** dépend du modèle retenu pour définir la loi de probabilité de la variable aléatoire « nombre de contre-exemples ».

Modèle binomial (1)

Examiner la qualité de la quasi-règle $a \Rightarrow b$, dans le cas où les variables sont binaires, revient à mesurer de façon équivalente celle de l'inclusion du sous-ensemble des transactions satisfaisant a dans le sous-ensemble des transactions satisfaisant b . Les contre-exemples relatifs à l'inclusion sont en effet les mêmes que ceux qui sont relatifs à l'implication exprimée par : « toute transaction satisfaisant a satisfait aussi b ». Dans cette optique ensembliste, dès que $n_a \leq n_b$, la qualité de la quasi-règle $a \Rightarrow b$, ne peut qu'être sémantiquement meilleure que celle de $b \Rightarrow a$. Nous supposons donc, par la suite, que $n_a \leq n_b$ lors de l'étude de $a \Rightarrow b$. Dans ce cas, la population-mère est finie et $\text{Card } E = n$.

Modèle binomial (2)

La modélisation binomiale fut chronologiquement la première adoptée. Rappelons brièvement en quoi consiste **le modèle binomial**.

Avec les notations adoptées, X et Y sont deux sous-ensembles aléatoires, indépendamment choisis dans l'ensemble des parties de E , respectivement de mêmes cardinaux n_a et n_b que les sous-ensembles de réalisations de a et de b . La valeur observée $n_{a \wedge \bar{b}}$ peut être considérée comme la réalisation d'une variable aléatoire $\text{Card}(X \cap \bar{Y})$ qui représente le nombre aléatoire de contre-exemples à l'inclusion de X dans Y , contre-exemples observés au cours de n tirages successifs indépendants.

Modèle binomial (3)

De là, $\text{Card}(X \cap \bar{Y})$ peut être considérée comme une variable binomiale de paramètres n et π où π est elle-même estimée par $p = \frac{n_a}{n} \frac{n_{\bar{b}}}{n}$.

Ainsi :

$$\Pr[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) = k] = C_n^k \left(\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2} \right)^k \left(1 - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2} \right)^{n-k}$$

Modèle binomial (4)

La variable centrée réduite estimée $Q(a, \bar{b})$ admet alors comme réalisation° :

$$q(a, \bar{b}) = \frac{n_{a \wedge \bar{b}} - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n} \left(1 - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2}\right)}}$$

Modèle binomial (5)

Nous obtenons l'intensité d'implication empirique

estimée :

$$\varphi(a, b) = 1 - \Pr\left[Q(a, \bar{b}) \leq q(a, \bar{b})\right] = 1 - \sum_0^{n_{a \wedge \bar{b}}} C_n^k \left(\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2}\right)^k \left(1 - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2}\right)^{n-k}$$

NB : La loi de probabilité de $Q(a, \bar{b})$ peut être approchée par celle de la loi de Laplace-Gauss centrée réduite $N(0,1)$.

Remarque : Nous pouvons noter que l'indice d'implication est nul si et seulement les deux variables a et b sont indépendantes. En effet

$$q(a, \bar{b}) = \frac{n_{a \wedge \bar{b}} - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n} \left(1 - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n^2}\right)}} = 0 \Leftrightarrow n_{a \wedge \bar{b}} - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n} = 0$$

$$q(a, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow n_{a \wedge \bar{b}} = \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n} \quad \text{ou encore}$$

$$q(a, \bar{b}) = 0 \Leftrightarrow \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n} = \frac{n_a}{n} \frac{n_{\bar{b}}}{n}$$

Cette dernière relation traduit la propriété d'indépendance statistique.

Paramétrage CHIC

Option [X]

Noeuds significatifs

Calcul long

Calcul des intervalles

OK

Annuler

Type d'implication

Implication selon la théorie classique

Implication entropique

Type de loi

Loi Binomiale

Loi de Poisson

Fenêtre de travail

Largeur

600

Hauteur

400

Seuil minimum de recherche

50

Couleurs des seuils (par ordre décroissant) du graphe implicatif

Options d'Apriori

Nombre de prémisses

1

Utilise l'originalité

Seuil d'équivalence

90

Seuil d'originalité

0

Modèle de Poisson (1)

Dans ce modèle, nous considérons que la variable « nombre de contre-exemples » $\text{Card}(X \cap \bar{Y})$ suit la distribution de probabilités de la variable de Poisson de paramètre λ

$$\forall s \in \{0,1,2,\dots,n\} \text{ Pr}[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) = s] = \frac{\lambda^s}{s!} e^{-\lambda}$$

Dans notre situation λ est remplacé par son estimation :

$$\hat{\lambda} = \lambda_{\text{estimé}} = \frac{n_a \cdot n_{\bar{b}}}{n}$$

Modèle de Poisson (2)

En conséquence, la probabilité pour que le hasard conduise, sous l'hypothèse d'absence de lien a priori entre a et b , à au plus le nombre de contre-exemples observé, est estimée par :

$$\Pr\left[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) \leq n_{a \wedge \bar{b}}\right] = \sum_{s=0}^{n_{a \wedge \bar{b}}} \frac{\hat{\lambda}^s}{s!} \cdot e^{-\hat{\lambda}}$$

L'intensité de l'implication estimée, notée $\varphi(a, b)$ est alors :

$$\varphi(a, b) = 1 - \Pr\left[\text{Card}(X \cap \bar{Y}) \leq n_{a \wedge \bar{b}}\right] = 1 - \sum_{s=0}^{n_{a \wedge \bar{b}}} \frac{\hat{\lambda}^s}{s!} \cdot e^{-\hat{\lambda}}$$

Modèle de Poisson (3)

La **variable** « indice d'implication » est dans ce cas

$$Q(a, \bar{b}) = \frac{\text{Card}(X \cap \bar{Y}) - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}}$$

La **valeur empirique** de l'indice :

$$q(a, \bar{b}) = \frac{n_{a \wedge \bar{b}} - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}}$$

Lien entre l'indice d'implication dans le modèle de Poisson et la mesure du χ^2

Proposition 3 Considérons la mesure χ^2 et l'indice d'implication $q(a, \bar{b})$

entre les variables binaires a et b alors $\frac{\chi^2}{q(a, \bar{b})^2} = \frac{n^2}{n_a n_{\bar{b}}}$

d'où

$$q(a, \bar{b}) = \frac{n_{a \wedge \bar{b}} - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}} = \frac{n_a n_b - n n_{a \wedge b}}{\sqrt{n n_a n_{\bar{b}}}}$$

et

$$\chi^2 = \frac{n(n_{a \wedge b} n_{\bar{a} \wedge \bar{b}} - n_{\bar{a} \wedge b} n_{a \wedge \bar{b}})^2}{n_a n_b n_{\bar{a}} n_{\bar{b}}}$$

Modèle de Poisson (4)

$$Q(a, \bar{b}) = \frac{\text{Card}(X \cap \bar{Y}) - \frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}{\sqrt{\frac{n_a n_{\bar{b}}}{n}}} \quad \text{qui résulte du centrage-réduction de la}$$

variable de Poisson, $\text{Card}(X \cap \bar{Y})$, peut être approchée par la variable gaussienne centrée réduite $N(0 ; 1)$.

Modèle de Poisson (5)

$$\varphi(a, b) = 1 - \Pr[Q(a, \bar{b}) \leq q(a, \bar{b})] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{q(a, \bar{b})}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Insistons sur le sens de cette intégrale. Elle représente la probabilité gaussienne pour que le nombre de transactions observées satisfaisant la quasi-règle $a \Rightarrow b$, soit supérieur à celui qui serait observable sous l'hypothèse d'indépendance de a et b . Autrement dit, $\Pr[Q(a, \bar{b}) \leq q(a, \bar{b})]$ est la **p-value** du test visant à réfuter l'hypothèse de l'indépendance de a et b au profit d'une relation de type quasi-implication

Paramétrage CHIC

Option [X]

Noeuds significatifs

Calcul long

Calcul des intervalles

Type d'implication

Implication selon la théorie classique

Implication entropique

Type de loi

Loi Binomiale

Loi de Poisson

Couleurs des seuils (par ordre décroissant)
du graphe implicatif

Utilise l'originalité

OK

Annuler

Fenêtre de travail

Largeur: 600

Hauteur: 400

Seuil minimum de recherche: 50

Seuil d'équivalence: 90

Seuil d'originalité: 0

Options d'Apriori

Nombre de prémisses: 1

L'implication statistique (3)

*Quelques concepts fondateurs de
la méthode d'analyse statistique
implicative*

Paramétrage CHIC

Option [X]

Noeuds significatifs

Calcul long

Calcul des intervalles

Type d'implication

Implication selon la théorie classique

Implication entropique

Type de loi

Loi Binomiale

Loi de Poisson

Couleurs des seuils (par ordre décroissant)
du graphe implicatif

Options d'Apriori

Nombre de prémisses

Utilise l'originalité

OK

Annuler

Fenêtre de travail

Largeur

Hauteur

Seuil minimum
de recherche

Seuil
d'équivalence

Seuil d'originalité

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche entropique (1)

Nous utilisons à la fois l'intensité d'implication et un autre indice qui rend compte de la dissymétrie entre les situations $S1=(a \text{ et } b)$ et $S'1=(a \text{ et non } b)$ qui concerne la quasi-règle $a \Rightarrow b$ ainsi que celle entre les situations $S2=(\text{non } a \text{ et non } b)$ et $S'2=(a \text{ et non } b)$ qui concerne la quasi-règle contraposée.

Ce sont les mêmes instances qui contredisent la quasi-implication et sa contraposée

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche entropique (2)

Fondée sur le concept d'entropie de Shannon (1949), l'entropie conditionnelle relative à $S1$ et $S'1$ quand a est réalisée :

$$H(b/a) = -\frac{n_{a \wedge b}}{n_a} \log_2 \frac{n_{a \wedge b}}{n_a} - \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n_a} \log_2 \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n_a}$$

$$H(\bar{a}/\bar{b}) = -\frac{n_{\bar{a} \wedge \bar{b}}}{n_{\bar{b}}} \log_2 \frac{n_{\bar{a} \wedge \bar{b}}}{n_{\bar{b}}} - \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n_{\bar{b}}} \log_2 \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n_{\bar{b}}}$$

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche entropique (3)

Posons $\alpha = \frac{n_a}{n}$ la fréquence de a, $\bar{\beta} = \frac{n_{\bar{b}}}{n}$ la fréquence de non b et $t = \frac{n_{a \wedge \bar{b}}}{n}$ la fréquence des contre-exemples. Nous construisons alors deux fonctions h_1 et h_2 définies dans $[0 ; 1]$ comme suit :

$$h_1(t) = H(b/a) = -\left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) \log_2 \left(1 - \frac{t}{\alpha}\right) - \frac{t}{\alpha} \log_2 \frac{t}{\alpha} \text{ si } t \in [0, \frac{\alpha}{2}[\text{ et } h_1(t) = 1 \text{ si } t \in [\frac{\alpha}{2}, \alpha]$$

$$h_2(t) = H(\bar{a}/\bar{b}) = -\left(1 - \frac{t}{\bar{\beta}}\right) \log_2 \left(1 - \frac{t}{\bar{\beta}}\right) - \frac{t}{\bar{\beta}} \log_2 \frac{t}{\bar{\beta}} \text{ si } t \in [0, \frac{\bar{\beta}}{2}[\text{ et } h_2(t) = 1 \text{ si } t \in [\frac{\bar{\beta}}{2}, \bar{\beta}]$$

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche entropique (4)

Définition 1: L' **indice d'inclusion de A**, support de a, **dans B**, support de b, est le nombre qui intègre l'information délivrée par la réalisation du nombre de contre-exemples, d'une part à la quasi-règle $a \Rightarrow b$ et, d'autre part, à la quasi-règle $\text{non}(b) \Rightarrow \text{non}(a)$

$$i(a, b) = [(1 - h_1^2(t))(1 - h_2^2(t))]^{\frac{1}{4}}$$

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche entropique (5)

Définition 2 : L'intensité d'implication-inclusion ou intensité entropique, est le nombre suivant:

$$\psi(a,b) = [i(a,b) \varphi(a,b)]^{1/2}$$

Formalisation de la quasi-règle implicative dans l'approche implifiance [implication+ confiance] (1)

Définition 3 : On appelle **implifiance** la mesure de l'implication statistique qui prend en compte l'implication directe et sa contraposée ainsi que la confiance en chacune de ces deux formes inclusives.

avec la confiance

$$\Phi(a, b) = \varphi(a, b)[C_1(a, b)C_2(\bar{b}, \bar{a})]^{1/4}$$

$$C_1(a, b) = Fr[Y|X] = \frac{Card(X \cap Y)}{Card(X)} = \frac{n_{a \cap b}}{n_a}$$

$$C_2(\bar{b}, \bar{a}) = Fr[\bar{X}|\bar{Y}] = \frac{Card(\bar{X} \cap \bar{Y})}{Card(\bar{Y})} = \frac{n_{\bar{a} \cap \bar{b}}}{n_{\bar{b}}}$$

Extension de l'Analyse Statistique Implicative aux variables non binaires

relation de propension entre deux variables modales

Considérons pour cela, n couples de variables aléatoires X_i et Y_i indépendantes et identiquement distribuées, pour tout sujet i , dont la moyenne et la variance estimées sont celles des observations empiriques de E . Les réalisations de ces variables sont respectivement les n couples (a_i, b_i) de valeurs de $[0, 1]^2$.

$$m_a = \frac{1}{n} \sum_{i \in E} a_i \quad v_a = \frac{1}{n} \sum_{i \in E} (a_i - m_a)^2$$

L'indice empirique d'implication devient :

$$\tilde{q}(a, \bar{b}) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i \in E} a_i \bar{b}_i - m_a m_{\bar{b}}}{\sqrt{\frac{v_a (v_b + m_{\bar{b}}^2) + m_a^2 v_b}{n}}}$$

Quant à l'estimation de l'intensité de propension, elle est encore obtenue par :

$$\varphi(a, b) = 1 - \Pr[\tilde{Q}(a, \bar{b}) \leq \tilde{q}(a, \bar{b})] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\tilde{q}(a, \bar{b})}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Représentations graphiques

Graphe implicatif

Représentations graphiques

Graphe
implicatif

Représentations graphiques

Grappe
implicatif

Fermeture
transitive

$$\varphi(a, b) > 0.50$$

C.H.I.C. 7

Idiome français

Opción

- Respeta las ocurrencias del grafo
- Nodos significativos
- Cálculo largo
- Cálculo de los intervalos
- Guarda los resultados

OK

Cancelar

Tipo de implicación

- Implicación según la teoría clásica
- Implifiance

Tipo de ley

- Ley Binomial
- Ley de Poisson

Colores de los umbrales (por orden
decreciente) del grafo implicativo

Opciones a priori

Número de variables

1

Utiliza la originalidad

Ventana de trabajo

Ancho

1000

Alto

2000

Umbral mínimo
de búsqueda

50

Umbral de
equivalencia

90

Umbral de
originalidad

50

C.H.I.C. 7

Idiome espagnol

C.H.I.C. 7

Idiome portugais

Opção

Nós significativos

Cálculo longo

Cálculo dos intervalos

OK

Cancelar

Tipo de implicação

Implicação segundo a teoria clássica

Implifiance

Tipo de lei

Lei Binomial

Lei de Poisson

Janela de

Largura

1000

Altura

2000

Valor de de busca

50

Cores dos valores de confiança (em do grafo implicativo)

Limiar de equivalência

90

Opções d'Apriori

Número de variáveis

1

Utilize a originalidade

Valor de

50

Thèse de doctorat en Sciences de l'éducation et de la formation (2023)

Mohamed Boumoudjou

Exemple

Base de données

Enseignement-apprentissage des mathématiques par la résolution de problèmes à l'école primaire en contexte plurilingue au Maroc : prise en compte des ressources mathématiques mobilisées dans des pratiques quotidiennes.

Approches pédagogique, didactique et ethnomathématique.

Classification hiérarchique cohésive ou cohésitive orientée

FIG. 10 *Un exemple de hiérarchie orientée*

Indice de cohésion degré 1 et 2

Définition de l'indice de cohésion de degré 1 d'une classe à un élément $\{a\}$

$$\text{coh}(a) = 1$$

Définition de l'indice de cohésion de degré 2 d'une classe à deux éléments $\{a,b\}$

$$\text{coh}(a, b) = (1 - [-p(\log_2(p)) - (1 - p)(\log_2(1 - p))]^2)^{\frac{1}{2}} \text{ où } p = \varphi(a, b) \geq 0.50$$

$$\text{coh}(a, b) = 0 \text{ si } p = \varphi(a, b) < 0.5$$

Indice de cohésion degré r

Définition de l'indice de cohésion de degré r d'une classe C à r éléments $\{a_1, a_2, \dots, a_r\}$

$$\text{coh}(C) = \left[\prod_{i=1, \dots, r-1}^{j=2, \dots, r \ j>i} \text{coh}(a_i, a_j) \right]^{\frac{2}{r(r-1)}}$$

Indice de cohérence d'une classe

Définition: La *cohérence* $o(C)$ d'une classe C d'une hiérarchie orientée est définie par la probabilité $Pr(I > i)$.

Variable I = nombre d'inversions dans une permutation. Comparer l'ordre des éléments de la classe orientée par la relation de quasi-implication et l'ordre des effectifs dans la construction du graphe implicatif

Indice CO de cohésion-cohérence d'une classe C_k

Définition : L'indice CO de cohésion-cohérence qui mesure la significativité de la classe C_{k+1} formée au niveau $k + 1$ est défini par :

$$co(C_{k+1}) = \frac{c(C_{k+1})}{c(C_k)} \cdot o(C_{k+1})$$